

Onlytraz F[®]

Amitraz 20,8%



PRESENTACIONES:
Frascos por: 20, 100, 500, 1000 mL
Cajas x 12 frascos x 20 mL

INDICACIONES: Onlytraz F, indicado en **BOVINOS** para el tratamiento y control de garrapatas Rhipicephalus (Boophilus) microplus y Amblyomma Cajennense. En **BOVINOS** aplicar mediante aspersión (bombas de mano, motorrociadora o manguera rociadora).

En **CANINOS** indicado contra garrapatas, pulgas, ácaros de la sarna: Demodex canis, Rhipicephalus sanguineus, Sarcoptes scabiei var. canis, Ctenocephalides canis.

DOSIFICACIÓN: Agítese bien el producto antes de mezclar.

BOVINOS: Mezclar 1 litro de Onlytraz F por 1000 litros de agua, inmediatamente antes de bañar el ganado, para evitar que el producto se degrade. Las cantidades que sobren después del baño deben eliminarse, pues el producto pierde efectividad antes de 48 horas.

En forma general siga la siguiente tabla para **bovinos**.

Onlytraz F para bomba de espalda (mL)	10	20	100
AGUA (litros)	10	20	100

FRECUENCIA DE LOS BAÑOS: Para el control de Rhipicephalus (Boophilus) microplus bañar cada 21 días. Para el control de Amblyomma cajennense bañar cada 7 días.

Aproximadamente con 4 litros de la mezcla es suficiente para bañar un animal adulto.

En **CANINOS:** Mezclar 2,5 mL de Onlytraz F en 2 Litros de agua.

-Perros pequeños: Bañar con 2 litros de mezcla.

-Perros grandes: Bañar con 4 litros de mezcla.

Bañar completamente el animal. Se recomienda repetir el tratamiento 15-20 días después o de acuerdo al criterio del médico veterinario.

Antes del baño, el perro debe estar completamente seco. Evite que el animal se lame, mientras se seca naturalmente.

Fumigar con mezcla de Onlytraz F la cama y demás sitios de permanencia del animal y dejar secar.

TIEMPO DE RETIRO: Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 14 días después de finalizado el tratamiento. La leche producida durante el tratamiento y 24 horas después de finalizado el mismo no debe darse al consumo humano.

CONTRAINDICACIONES: No use el producto en **EQUINOS**, ni en **perros de raza Chihuahua**. No usar en animales menores a tres meses. No usar en caninos hembras que estén en estado de preñez. No usar Onlytraz F cuando se esté tratando el animal con otro antagonista adrenérgico (Ej: Xilicina)


EL TRIPLE LAVADO

Con el triple lavado aproveche el 100% del contenido del producto en el envase, reduce la contaminación ambiental y los riesgos a su salud y la de su familia

1 Vacíe el envase en el tanque, la manga o la bomba en posición de descarga por 30 segundos o hasta agotar su contenido y agregue agua hasta $\frac{1}{4}$ de la capacidad del envase

2 Cierre el envase y agite por 30 segundos

3 Vierta el agua del envase en el tanque, la manga o la bomba de espalda. Mantenga el envase en posición de descarga por 30 segundos.



REALICE 3 VECES ESTE PROCEDIMIENTO

Elaborado por **ONLYPHARM S.A.S.**
Bogotá D.C., Colombia
Director Técnico: J. Gustavo Hernández Q.F. U.N.
Colombia Reg. ICA No. 5966 DB
Panamá Reg. MIDA RF-7450-15
Guatemala Reg. MAGA CO380-43-02-2460
Honduras Reg. SENASA IP-610

Distribuido por:

Onlytraz F[®]

Amitraz 20,8%



SOLUCIÓN - GARRAPATICIDA. USO VETERINARIO

COMPOSICIÓN:

Cada 100 mL de concentrado emulsionable Contienen:
AMITRAZ N-metilbis (2,4-xililiminometil) amina 20.8 g.
Excipientes c.s.p. 100.0 mL



info@onlypharm.com.co
www.onlypharm.com.co
Calle 24 # 24 - 51, Bogotá D.C., Colombia
Tel: +571 703 4242

