

PREDATHION[®]

E.C. SOLUCIÓN

ETHION 83%



SOLUCIÓN - GARRAPATICIDA. USO VETERINARIO

COMPOSICIÓN:

Cada 100 mL de concentrado emulsionable contienen:

ETHION 0,0,0',0' – Tetraetil-S, S-methilen bis (fósforo Ditioato) 83 g

Excipientes c.s.p.

100 mL



info@onlypharm.com.co

www.onlypharm.com.co

Calle 24 # 24 - 51, Bogotá D.C., Colombia

Tel: +571 703 4242



PREDATHION[®]

E.C. SOLUCIÓN

ETHION 83%



PRESENTACIONES:

Frascos por: 30, 100, 250, 500, 1000 mL
Caja x 12 frascos x 30 mL

INDICACIONES:

En **bovinos** para el control y tratamiento de infestación parasitaria causada por **Garrapatas**: Rhipicephalus (Boophilus) microplus y Amblyomma cajennense, **Moscas**: Haematobia irritans, Stomoxys calcitrans y musca doméstica.

ESPECIES PARA LAS CUALES ES RECOMENDADO: Bovinos

VÍAS DE ADMINISTRACIÓN: En baños por aspersión

DOSIS Y MODO DE EMPLEO:

Mangas de aspersión: Mezclar un litro de Predathion E.C. por 1300 litros de agua. Para bomba de espalda o mano: Diluir 15mL del producto en 20 litros de agua y agitar bien.

Cuando se usan bombas de espalda: Un animal adulto requiere entre 4 y 5 litros de solución.

FRECUENCIA DE LOS BAÑOS:

Para el tratamiento de Rhipicephalus (Boophilus) microplus realizar baños cada 21 días; en el tratamiento de Amblyomma cajennense, realice baños cada 7 días

TIEMPO DE RETIRO:

Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 14 días después de finalizado el tratamiento. La leche producida durante el tratamiento y 96 horas después de finalizado el mismo no debe darse al consumo humano.

ADVERTENCIAS:

El fabricante garantiza que las características fisicoquímicas del producto corresponden a las anotadas en la etiqueta, y que mediante el registro oficial de venta, se verificó que es apto para los fines aquí mencionados, de acuerdo con las indicaciones de empleo.


EL TRIPLE LAVADO

Con el triple lavado aproveche el 100% del contenido del producto en el envase, reduce la contaminación ambiental y los riesgos a su salud y la de su familia.

1 Vacíe el envase en el tanque, la manga o la bomba en posición de descarga por 30 segundos o hasta agotar su contenido y agregue agua hasta $\frac{1}{4}$ de la capacidad del envase

2 Cierre el envase y agite por 30 segundos

3 Vierta el agua del envase en el tanque, la manga o la bomba de espalda. Mantenga el envase en posición de descarga por 30 segundos.



REALICE 3 VECES ESTE PROCEDIMIENTO

Elaborado por **ONLYPHARM S.A.S.**, Bogotá D.C. Colombia
Director Técnico: J. Gustavo Hernández Q.F. U.N.
Reg. Colombia: ICA 7288-MV
Reg. Panamá: MIDA RF-74-49-15
Reg. Guatemala: MAGA CO382-43-02-2477
Reg. Honduras: SENASA IP-476

Distribuido por: